




Unidad Médica de Atención: _____ CLUES: _____
Nombre de la niña: _____ No de Identificación: _____
Domicilio de la niña: _____
Fecha de Nacimiento: ____/____/____ Fecha de ingreso a control: ____/____/____

IMC para la edad NIÑAS

Puntuación Z (5 a 19 años)



Fuente: OMS 2007

Puntos de corte:

Sobrepeso: >+1SD (IMC equivalente a 25 kg/m² a los 19 años)

Obesidad: >+2SD (IMC equivalente a 30 kg/m² a los 19 años)

Bajo peso: <-2SD

Bajo peso severo: <-3SD

Patrones de crecimiento infantil de la OMS

Valores de circunferencia de cintura de acuerdo a edad y sexo en población mexicana

Edad (año)	Circunferencia (cm)			
	Niños		Niñas	
	Percentila 50	Percentila 75	Percentila 50	Percentila 75
2*				
3*				
4*				
5*				
6	54.7	61.3	52.4	59.0
7	57.0	64.0	55.0	61.7
8	59.3	66.8	57.6	64.3
9	61.6	69.5	60.3	67
10	63.8	72.3	62.9	69.7
11	66.1	75.0	65.5	72.3
12	68.4	77.8	68.1	75.0
13	70.7	80.5	70.8	77.7
14	73.0	83.3	73.4	80.3
15	75.2	86.0	76.0	83.0
16	77.5	88.8	78.6	85.7
17*				
18**	>95		>85	
19**	>95		>85	

Adaptado de Klünder - Klünder M and Flores-Huerta S. Waist circumference values according to height percentiles: A proposal to evaluate abdominal abesity in Mexican Children and adolescents between 6 to 16 years of age. Arch Med Res 2011; 42(6): 515-22.

* No existe información publicada para población mexicana en estas edades.

** Valores recomendados para adultos mexicanos (cm).

Puntos de cohorte:

Valores cercanos a la percentila 75 indican riesgo cardiovascular.